

# Rehydrat<sup>®</sup> Tabs

**agilan<sup>®</sup> pašaro papildas veršeliams, paršeliams ir paukščiams virškinimui gerinti**  
**Labai tirpus, putojantis, turintis daug energijos ir elektrolitų**

**Sudėtis:** laktozė, natrio bikarbonatas, natrio chloridas, kalio chloridas

**Analitinės sudedamosios dalys:** žali baltimai – 5,6 %, žali riebalai – 1,4 %, žalia ląsteliena – 0,5 %, žali pelenai – 17,4 %, natrio kiekis – 6,5 % kalio kiekis – 1,3 %, chloro kiekis – 4,5 %, lizinas – 0,0 %, metioninas – 0,00 %.

**Priedai 1 kg: Maistiniai priedai: Vitaminai:** Vitaminas C (3a300) – 10 000 mg.

## PASKIRTIS

Veršelių, paršelių ir paukščių oralinei rehidratacijai.

Dėl tinkamos mineralinės sudėties ir dėka laktozės esančios pašaro papilde Rehydrat<sup>®</sup> Tabs greitai ir patikimai atstato organizmo elektrolitų, vandens netekimą ir energijos trūkumą.

## NAUDOJIMO BŪDAS IR DOZĖS

**Veršeliams:** 1 tabletę ištirpinti 1 litre drungno vandens.

Skirti 1- 3 kartus dienoje papildomai su įprastiniu pieno girdymu. Atsižvelgiant į fiziologinio virškinimo sutrikimo ūmumą galima skirti nepriklausomai nuo pieno girdymų dažnio.

Rehydrat<sup>®</sup> Tabs paruoštas tirpalas girdomas tol, kol yra pakitusi išmatų konsistencija.

| Išmatų konsistencija        | Papildomų skysčių poreikis (% k. s.) | 40 kg veršelis |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|
|                             |                                      | Per dieną      | Girdymų skč. per dieną    |
| Pastos konsistencija        | iki 5 %                              | 2 litrai       | 2 litrai kartą dienoje    |
| Skystos košės konsistencija | iki 10 %                             | 4 litrai       | 2 litrai 2 kartus dienoje |
| Vandeninga                  | 15-20 %                              | 6 (-8) litrai  | 2 litrai 3 kartus dienoje |

**Paršeliams:** 1 tabletę ištirpinti 1 litre drungno vandens.

Rehydrat<sup>®</sup> Tabs paruoštą tirpalą leist laisvai gerti. Geriausia, kad kelis kartus per dieną būtų ruošiamas šviežias tirpalas. Tai sukelia paršelių smalsumą ir apsaugo tirpalą nuo aplinkos kvapų ir taršos.

**Naminiams paukščiams:** ištirpinkite 1 tabletę 100 litrų geriamo vandens.

## Girdymo instrukcija

Kiekvienam girdymui tirpalas turi būti ruošiamas šviežiai švariame vandenyje.

Rehydrat<sup>®</sup> Tabs paruoštą tirpalą skirti intervalais kartu su pieno ar pieno pakaitalų girdymu. Laktozės dėka Rehydrat<sup>®</sup> Tabs tirpale yra daug energijos mažos koncentracijos tirpale.

Laktozė palaiko laktazės aktyvumą, kad būtų galima grįžti prie įprasto girdymo pienu.

Pašaro papildas negali būti girdomas vietoje paprasto vandens.

**Rekomenduojamas girdymo laikas:** 1-7 dienos.

Skirti esant fiziologinio virškinimo sutrikimo pavojui, virškinimo sutrikimo laikotarpiais arba po jų.

Prieš skiriant ar pratęsiant pašaro papildą vartojimą rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.

**Laikymo sąlygos:** Galiojimo laiko garantija galioja tik neatidarytoms pakuotėms, laikomoms vėsioje ir sausoje vietoje.

Pašaro papildą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

**GAMINTOJAS:** mepro-Dr. Jaeger ir Bergmann GmbH - Lohner g. 19-49377 Vechta ,  
gamintojo pripažinimo Nr.: αDE NI 4 00127

**PLATINTOJAS:** UAB "PARTNERVETAS" V. Maciulevičiaus g. 51, LT 04310 Vilniaus m.  
Tel.: 8 5 203 4257

Tiekti rinkai kombinuotuosius pašarus įregistravimo Nr.: rLT KPT 250840

**Grynasis kiekis: 30 tablečių po 50g.**

Partijos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.

Geriausia iki: žiūrėti ant pakuotės.

Teksto peržiūros data: 2022 gruodis.