

Rehydrat® Tabs

agilan® pašaro papildas

Gali padėti virškinimui, labai tirpus, putojantis, turintis daug energijos ir elektrolitų, skirtas veršeliams, paršeliams ir naminiams paukščiams

Gali padėti veršeliams, paršeliams ir paukščiams organizmo skysčių atstatymui

Sudėtis: laktozė, natrio bikarbonatas, natrio chloridas, kalio chloridas.

Analitinės sudedamosios dalys: žali pelenai – 17,4 %, natriis – 6,5 %, žali baltimai – 5,6 %, chloridas – 4,1 %, žali riebalai – 1,4 %, kalis – 1,2 %, žalia ląsteliena – 0,5 %, lizinas – 0,0 %, metioninas – 0,0 %.

Priedai 1 kg: Maistiniai priedai: Vitaminai: Vitaminas C (3a300) – 10 000 mg.

Technologiniai priedai: Konservantai: Citrinų rūgštis (3a330) – 150 000 mg.

Naudojimo tikslas.

Dėl tinkamos mineralinės sudėties ir dėka laktozės esančios pašaro papilde, Rehydrat® Tabs gali padėti greitai papildyti organizmą elektrolitais ir gali padėti atstatyti vandens netekimą ir energijos trūkumą.

NAUDOJIMO BŪDAS IR DOZĖS. Veršeliams: 1 tabletę ištirpinti 1 litre drungno vandens.

Skirti 1- 3 kartus dienoje papildomai su įprastiniu pieno girdymu. Atsižvelgiant į fiziologinio virškinimo sutrikimo ūmumą galima skirti nepriklausomai nuo pieno girdymų dažnio. Rehydrat® Tabs paruoštas tirpalas girdomas tol, kol yra pakitusi išmatų konsistencija.

Išmatų konsistencija	Papildomų skysčių poreikis (% k. s.)	40 kg veršelis	
		Per dieną	Girdymų skč. per dieną
Pastos konsistencija	iki 5 %	2 litrai	2 litrai kartą
Skystos košės konsistencija	iki 10 %	4 litrai	dienoje
Vandeninga	15-20 %	6 (-8) litrai	2 litrai 2 kartus dienoje 2 litrai 3 kartus dienoje

Paršeliams: 1 tabletę ištirpinti 1 litre drungno vandens.

Rehydrat® Tabs paruoštą tirpalą leist laisvai gerti. Geriausia, kad kelis kartus per dieną būtų ruošiamas šviežias tirpalas. Tai sukelia paršelių smalsumą ir apsaugo tirpalą nuo aplinkos kvapų ir taršos.

Naminiams paukščiams: ištirpinkite 1 tabletę 100 litrų geriamo vandens.

Girdymo instrukcija. Kiekvienam girdymui tirpalas turi būti ruošiamas šviežiai su švariu vandeniu.

Rehydrat® Tabs paruoštą tirpalą skirti intervalais kartu su pieno ar pieno pakaitalų girdymu.

Laktozės dėka Rehydrat® Tabs tirpale yra daug energijos mažos koncentracijos tirpale.

Laktozė palaiko laktazės aktyvumą, kad būtų galima grįžti prie įprasto girdymo pienu.

Pašaro papildas negali būti girdomas vietoje paprasto vandens.

Pašaro papildas dienos racione gali būti tik iki 10 %.

Vienu metu draudžiama naudoti skirtingas organines rūgštis ar jų druskas jei vienos ar keleto jų kiekis yra arti maksimalaus leistino

Rekomenduojamas girdymo laikas: 1-7 dienos.

Skirti esant fiziologinio virškinimo sutrikimo pavojui, virškinimo sutrikimo laikotarpiams arba po jų.

Prieš skiriant ar pratęsiant pašaro papildą vartojimą rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.

Laikymo sąlygos: Galiojimo laiko garantija galioja tik neatidarytoms pakuotėms, laikomoms vėsioje ir sausoje vietoje.

Pašaro papildą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

GAMINTOJAS: mepro-Dr. Jaeger ir Bergmann GmbH - Lohner g. 19-49377 Vechta,

Gamintojo patvirtinimo Nr.: α DE NI 400127

PLATINTOJAS: UAB "Partnervetas" V. Maciulevičiaus g. 51, LT 04310 Vilniaus m., tel.: 8 5 203 4257

Tiekti rinkai kombinuotuosius pašarus įregistravimo **Nr.: rLT KPT 250840**

Grynasis kiekis: 1 500 g (30 tablečių po 50 g)

Partijos Nr.: žiūrėti ant pakuotės. Geriausia iki: žiūrėti ant pakuotės..

Teksto peržiūros data: 2024 gegužės mėn.