

Trockenvitamin-Konzentrat

agilan[®] dietinis pašaro papildas tirpus vandenyje

Pasiruošimui rujai ir reprodukcijai palaikyti kiaulėms naminiams paukščiams ir atrajotojams

Pagrindinės mitybos savybės

Didelis vitaminų A ir D kiekis

Sudėtis: Laktozė, natrio chloridas.

Analitinės sudedamosios dalys: žali pelenai - 6,5 %, žali baltymai - 3,6 %, natris - 2,0 %, žali riebalai - 0,2 %, žalia ląsteliena - 0,0 %, lizinas - 0,0 %, metioninas - 0,0 %.

Priedai 1 kg: Maistiniai priedai: Vitaminai: Vitaminas A (3a672a) – 1 000 000 TV; Vitaminas D₃ – (3a671) – 200 000 TV; Vitaminas E (visų racematų alfa tokoferilacetatas) (3a700i) – 5 250 mg; Vitaminas B₁ (3a820) – 1 500 mg; Vitaminas B₂ (3a825ii) – 3 750 mg; Vitaminas B₆ (piridoksino hidrochloridas) (3a831) – 2 000 mg; Vitaminas B₁₂ (cianokobalaminas) (3a837) – 7 500 µg; Vitaminas K₃ (3a711) – 1 750 mg; Vitaminas C (3a300) – 50 000 mg; Niacinamidas (3a315) – 18 000 mg; Kalcio D-pantotenatas (3a841) – 6 500 mg; Folio rūgštis – (3a316) - 400 mg.

Naudojimo (šėrimo) rekomendacijos: 5 g pašaro papildo - 1 l geriamo vandens.

Karvėms: pradėti šerti likus 2 savaitėms iki veršiamosi ir šerti iki kito veršingumo nustatymo.

Paršavedėms: pradėti šerti likus 7 dienoms iki paršiamosi ir 3 dienas po paršiamosi. Taip pat pradėti šerti likus 7 dienoms iki kergimo ir 3 dienas po kergimo.

Kitoms žinduolių patelėms: šerti vaikingumo pabaigoje iki kito vaikingumo nustatymo.

Dedeklėms: esant lytiniam aktyvumui.

Visiems patinams: reprodukcinio aktyvumo metu.

Naudojimo tikslas. Gali padėti augimo metu rodiklių gerinimui, esant stresui po gyvūnų vakcinacijos, sveikimo metu arba išsaugoti bendrą organizmo gerą būklę.

Šėrimo nurodymai

Pašaro papildo sudėtyje vitaminų A ir D₃ koncentracija yra daugiau nei 100 kartų didesnė lyginant su šių vitaminų kiekiu bendrame pašare. Dėl vitamino A padidinto kiekio koncentrate, maksimali leistina dozė veisliniams gyvūnams tik iki 0,9 % dienos raciono.

Neleidžiama vartoti kartu su vitaminu D2.

Prieš pradėdant naudoti pašaro papildą ar pratęsiant jo naudojimo laikotarpį, būtina pasikonsultuoti su šėrimo specialistu ar veterinarijos gydytoju.

Šėrimo rekomendacijos: 5 g pašaro papildo - 1 l geriamo vandens.

Įspėjimas apie pavojų

H412 Ilgalaikis poveikis kenksmingas vandens organizmams.

Saugos pranešimai. P273 Vengti patekimo į aplinką. P501 Pašaro papildas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Laikymo sąlygos. Galiojimo laiko garantija taikoma tik neatidarytoms talpykloms laikomoms vėsioje ir sausoje vietoje.

GAMINTOJAS: mepro –Dr. Jaeger ir Bergmann Gm bH – Lohner g.19-49377 Vechta, Vokietija.

Gamintojo patvirtinimo Nr.: α DE NI 400076

PLATINTOJAS: UAB PARTNERVETAS

V. Maciulevičiaus g. 51, LT 04310 Vilniaus m. Tel.: 8 5 203 4257

Tiekti rinkai kombinuotuosius pašarus įregistravimo Nr.: rLT KPT 250840

Grynasis kiekis: 10 kg

Partijos Nr.: žiūrėti ant pakuotės. Geriausia iki: žiūrėti ant pakuotės.

Teksto peržiūros data: 2024 birželio mėn.